

Kontraindikacije PMU tretmana:

Obavezna Konzultacija s Liječnikom:

- Osobe koje imaju dijabetes trebaju se prethodno konzultirati s liječnikom.
- Fileri na usnama mogu uzrokovati kraće trajanje pigmenta.
- Osobe koje imaju pejsmejker moraju se konzultirati s liječnikom prije postupka.

Alergijske Reakcije:

- Osobe s sklonosti alergijama na određene metale, anestetike, lateks, kanu i druge tvari trebaju se podvrgnuti alergotestu minimalno 48 sati prije postupka.

Posebne Situacije:

- Madeži i bradavice ne smiju se tretirati pigmentima.
- Trudnice i dojilje trebaju izbjegavati tretman radi rizika od alergijske reakcije.
- Osobe koje boluju od hepatitisa, HIV-a, AIDS-a ili sličnih teško zaraznih bolesti ne preporučuje se podvrgavanje tretmanu zbog slabijeg imuniteta.

Ostale Kontraindikacije:

- Osobe koje imaju bolesti oka, upale ili pad imuniteta trebaju odgoditi tretman.
- Dermatitis može uzrokovati slabije prihvaćanje i upijanje pigmenta.
- Ožiljci mogu utjecati na upijanje boje i pigmenta.
- Tretman se odgađa u slučaju povišene temperature, herpesa ili perlade na tijelu.
- Osobe pod utjecajem alkohola ili opijata trebaju odgoditi tretman.
- Osobe s autoimunim bolestima trebaju se posavjetovati sa svojim liječnikom prije tretmana.

Tretman Se Zaustavlja U Slučaju:

- Prekomjerne боли.
- Prekomjernog curenja limfe.
- Gubitka svijesti.
- Nepredvidivih i iznenadnih reakcija.
- Mučnine i vrtoglavice.